



RI.MOS. VET

HypermiX[®]



**CATÁLOGO RESERVADO EXCLUSIVAMENTE
A VETERINARIOS**

www.rimos.com



PARA PIEL DAÑADA. HIDRATA Y ALIVIA.

ES REPELENTE DE INSECTOS, por lo que tiene un amplio campo de aplicación en animales que viven al aire libre.

HYPERMIX® es un tratamiento tópico que favorece la regeneración de las lesiones externas.

Agudas - Crónicas - Infectadas



**COADYUVANTE EN LA
REPARACIÓN Y
REGENERACIÓN DE LA
PIEL DAÑADA**



**CONTROL DE
LA CARGA
BACTERIANA**



**PROTECCIÓN DEL TEJIDO CUTÁNEO
LESIONADO O ENROJECIDO**

El efecto combinado de las dos plantas (Neem e Hypérico) contenidas en **HYPERMIX®** es mayor que la suma de sus efectos individuales (bibliografía disponible previa solicitud).



NEEM (Azadirachtin)



Antiséptico
Antimicrobiano
Antiinflamatorio
Antifúngico



HIPÉRICO (Hyperforin)

Regenerador
Reepitelizante
Calmante




CASOS CLÍNICOS - MASCOTAS

Día 0



Día 25




DERMATITIS - Duración: 25 días.

GATA - Dermatitis por fotosensibilización en ambos pabellones auriculares.

Tratamiento con **Hypermix® GEL** 2 veces al día, precedido de una limpieza con suero fisiológico.

Cortesía de: **Dr. Marco Lapia - ENPA de Trieste**

Antes del curetaje



Día 28



HERIDA - Duración: 28 días.

PERRO - Herida profunda causada probablemente por un cepo.


Tras la limpieza y los baños en agua templada-caliente para reactivar la circulación y tras el curetaje quirúrgico, se inició terapia láser diaria con aplicación de **Hypermix® GEL** y vendaje.

Cortesía de: **Amb. Vet. Ass. SANTO STEFANO - Dr. Biondi S. y Dr. Mercuri M.**

Día 0



Día 35



QUEMADURA - Duración: 35 días.

BULLDOG FRANCÉS - Quemadura.

Tras el curetaje de la zona, se prescribió tratamiento antibiótico con clindamicina, lavados bimensuales con jabón de Marsella y aplicación de **Hypermix® ACEITE**.

Cortesía de: **Dr. Antonio Silvestri**

Día 1



Día 20



Día 45



DEHISCENCIA POSQUIRÚRGICA - En fase de curación.

PODENCO, 6 años - Dehiscencia parcial de herida quirúrgica tras artrodesis pantarsal por fractura múltiple del tarso derecho.

Se realizó lavado con **Kanarescue® BATH**, dejándolo actuar durante 5 minutos antes de enjuagar con solución salina. Posteriormente, se aplicó **Hypermix® ACEITE** y **Hypermix® GASAS**, cubriendo con vendaje renovado cada 3 días. Se observó un crecimiento considerable del tejido, con excelente granulación y rápida epitelización, a pesar de la escasa cantidad de tejido muscular en la zona y la presencia de la placa metálica.

Caso en evolución favorable.

Cortesía de: **Dr. Rocco Sanseverino**

Día 1



Día 3



Día 10



FÍSTULA ANAL - Duración: 10 días.

PITBULL, 5 años - Fístula anal del saco izquierdo.

Se realizó una aplicación profunda de **Hypermix® GEL** dos veces al día durante 10 días. Ya al tercer día se observó una clara mejoría del tejido circundante y una reducción de la salida de la fístula. A los 10 días, la fístula estaba completamente cerrada y cicatrizada.

Cortesía de: **Dr. Rocco Sanseverino**

Día 1



Día 12



Día 48



HERIDA POSQUIRÚRGICA - En fase de curación.

CANINO - Herida en el segundo dedo de la mano izquierda tras cirugía por masa tumoral.

Inicialmente, se realizó cura postquirúrgica con vendaje renovado cada 2 días, pero al segundo cambio la herida se abrió. Se probaron aplicaciones de miel, blastoestimulina y azúcar sin mejoría, y a los 9 días se usaron apósitos de plata con solo un pequeño avance. A los 21 días desde la primera cura, se inició tratamiento con productos **Hypermix®**. Se limpió con **Kanarescue® FOAM**, dejándolo actuar durante 5 minutos. Luego, se aplicó una capa fina de **Hypermix® GEL** y se cubrió con **Hypermix® GASAS**. Finalmente, se protegió con vendaje renovado cada 4 días, repitiendo el tratamiento.

Cortesía de: **Dr. Rocco Sanseverino**

CASOS CLÍNICOS - EXÓTICOS



Día 0




Día 40

HERIDA - Duración: 40 días.

CONEJO ENANO - Herida traumática por mordedura en la zona cervical lateral. Tratamiento inmediato: irrigación con suero fisiológico tibio. Eliminación manual de los fragmentos de tejido necrótico. Aplicación de **Hypermix® ACEITE** 2 veces al día. Cortesía de: **Dr. Gianluca Marchetti**



Día 0



Día 60

LESIONES - Duración: 60 días.

TESTUDO HERMANNI (Hembra - adulta) - Lesiones graves por mordedura. En los primeros 10 días, tratamiento intramuscular antibiótico, antiinflamatorio y analgésico y rehidratación intracelómica. Tras la limpieza, se aplicó una pomada antibiótica y después **Hypermix® GASAS** (una vez al día durante 7 días). Con la aparición de tejido de granulación, tratamiento local solo con **Hypermix® GASAS**: primero a diario, luego en días alternos durante aproximadamente un mes. Con la formación de tejido cicatricial, se pasó a aplicar semanalmente **Hypermix® SPRAY**. Cortesía de: **Dra. Diana Cassano DVM GPCert (ExAP)**




Día 0



Día 6

GINGIVITIS - Duración: 6 días.

TURÓN - Gingivitis bacteriana. Aplicación de **Hypermix® GEL** 2 veces al día, todos los días. Cortesía de: **Dr. Riccardo Mancini - Actividad circense "Zoo Safari, La Favola Siamo Noi"**



Día 0



Día 25

DERMATITIS - Duración: 25 días.

PITÓN MOLURUS BIVITTATUS - Dermatitis por quemaduras con resultado positivo en Pseudomonas aeruginosa. Tratada con marbofloxacin durante 10 días, desinfección cada 48-72 horas con clorhexidina en gel y eliminación del tejido necrótico, hasta la muda. Se utilizó **Hypermix® SPRAY** a partir de la 2ª semana. Cortesía de: **Dr. Alessandro Guerra**

CASOS CLÍNICOS - EQUINOS



Día 0



Día 21

ONICOMICOSIS - Duración: 21 días.

PURASANGRE - Casco comprometido con desprendimiento de la pared de los tejidos subyacentes. Después de limpiar la palma de hormiguillo, tratamiento con **Hypermix® ACEITE** al menos una vez al día. Cortesía de: **Rosario Guida, Equisud**



Día 0



Día 30

DERMATITIS - Duración: 30 días.

CABALLO - Dermatitis estival. Los primeros siete días se hicieron baños con esponja con **Hypermix®**, sin lavar ni cepillar el pelaje. En los días siguientes, se lavó y secó bien al caballo en la zona afectada y se le aplicó **Hypermix®**. Después de cada aplicación, se expuso al caballo al sol (no durante las horas punta). Se utilizó un total de 150 ml de **Hypermix®**. Cortesía de: **Rosario Guida, profesor de Mascalcia 4º nivel**



Día 0



Día 60

HERIDA - Duración: 60 días.

YEGUA REPRODUCTORA PURASANGRE - Herida en el antebrazo. Aplicación de **Hypermix® ACEITE** una vez al día. Cortesía de: **Dr. Riccardo Rossi**



HYPERMIX® está disponible en **formulación OLEOSA, GEL y GASAS CON GEL** para tratar diversas lesiones cutáneas.

La mayor concentración de componentes en la **formulación OLEOSA** ayuda a mantener las infecciones bajo control, potenciando así una acción limpiadora y desbridante. El aceite también se recomienda cuando la formulación en gel no puede llegar a la zona de tratamiento.

La **formulación en GEL** tiene una menor concentración de componentes, sin que ello afecte a la eficacia del producto.

Se recomienda el uso de **GASAS CON GEL Hypermix®** en caso de lesiones amplias. Desechables, no reabsorbibles.

CÓMO UTILIZAR HYPERMIX®?

Limpiar la piel con solución estéril.


Aplicar una capa ligera de Hypermix® sobre toda la lesión con una frecuencia de una vez al día hasta que se resuelva el problema.

La frecuencia del tratamiento puede variar según el tipo de lesión, a discreción del veterinario.

APLICACIÓN

Aplicar siempre una fina capa de GEL o de ACEITE Hypermix® para formar una barrera fina e invisible sobre la lesión. Se recomienda aplicar el producto **más allá de los bordes de la herida**, para garantizar una regeneración tisular adecuada.

Superar la cantidad recomendada no aumenta la eficacia del producto.



Aplicar las GASAS CON GEL Hypermix® directamente sobre la lesión y cubrir la piel tratada con vendas o gasas transpirables.

Se recomienda la cobertura en el caso de animales expuestos habitualmente al sol, para lesiones muy grandes con riesgo de contaminación ambiental o en sujetos que convivan con otros animales.

Se recomienda sustituir la gasa medicada cada 24 horas o según las instrucciones del veterinario.

ACEITE



5 viales de 5 ml cad.
Formulación oleosa
(en sobre individual)

REF. 100102



50 viales de 5 ml cad.
Formulación oleosa
(en sobre individual)

REF. 9000150



30 ml espray
Fórmula en espray
(380 pulverizaciones)

REF. 10030SP

Solo envíos por tierra

GEL



Tubo de 30 ml
Formulación Gel

REF. 10030TGY




Tarro de aluminio de 200 ml
Formulación Gel

REF. 10200VA



30 Gasas con Gel 10 cm x 10 cm
Formulación Gel
(en sobre individual)

REF. 10030GMS



Síguenos en

Referente
España / Sudamérica

Luigi Giusti
l.giusti@rimos.com

Referente de zona



RI.MOS.
Medical Products

Via Manuzio, 15 - 41037 - Mirandola (MO) - ITALY
Tel: +39 0535 25755 - info@rimos.com - www.rimos.com

rimosvet

